



ACCESSORI MONITORAGGIO INSETTI

AGBIO

DEAD-INN™ TRAP

TRAPPOLA PER LA CATTURA DI CIMICI ASIATICHE

CARATTERISTICHE

Dead-Inn™ Trap è la prima trappola ecologica a feromone per la cattura massale delle cimici asiatiche (*Halyomorpha halys*) dal design brevettato. La trappola combina il potere attrattivo del feromone di aggregazione a colori percepiti dagli insetti bersaglio. Il feromone viene rilasciato gradualmente in modo da agire per almeno 30 giorni.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Ambienti Civili, Aree Verdi, Ho.re.ca., Industria Alimentare

Libera Vendita

INSETTI TARGET

Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*).

MODALITÀ D'USO

È consigliabile installare almeno 3-4 trappole per sito, a partire da metà marzo/inizio aprile, rispettando queste indicazioni:
Indirizzare il monitoraggio nelle aree più favorevoli allo sviluppo dell'insetto, in particolare nelle zone perimetrali della coltura, in prossimità di siepi e/o di edifici.
Mantenere una distanza di almeno 20-30 m tra una trappola e l'altra.
Posizionare le trappole su piante attrattive per la cimice, possibilmente con frutti e possibilmente entro 20-30 m da un edificio (soprattutto ad inizio stagione).
L'operatore potrà scegliere di posizionare le trappole sulle piante di bordo della coltura o su piante spontanee presenti nelle vicinanze.

DIMENSIONI

61 X 25,5 cm ø

ATTENZIONE

In caso di popolazioni elevate di *Halyomorpha halys*, attorno alle trappole poste nel frutteto si può avere un incremento dei danni.
Controllare e svuotare settimanalmente le trappole.
Cambiare i feromoni ogni 7 settimane

PZ/CARTONE

Trappola 1pz
Feromone 6pz x1